

## Amanita pantherina



(D.C.: Fr.) Krombh. - "Tignosa Bruna" - "Bigia"

**Cappello:** color bruno più o meno scuro (ma anche grigio bruno) da giovane racchiuso in un velo bianco, più tardi con verruche sempre bianche

**Lamelle:** bianche

**Gambo:** bianco

**Anello:** bianco, basso sul gambo negli esemplari adulti

**Volva:** bianca, circoncosa

**Carne:** bianca

### Principalmente confondibile con

\* "Amanita rubescens" ("Tignosa vinata"), commestibile dopo cottura, avente verruche grigie, anello "alto", carne frequentemente con macchie vinose;

\* "Amanita gemmata", specie ritenuta da taluni commestibile, nonostante provochi anche intossicazioni, le cui caratteristiche principali sono il cappello generalmente giallo, o giallo-ceraceo. Ma non sempre! Per il resto è uguale all'"Amanita pantherina");

\* "Amanita vaginata" e gruppo affine, tutte commestibili, ma prive di anello.

### Dove si trova

Comune sotto le latifoglie, un po' meno frequente in presenza di conifere. Si trova in estate ed in autunno.

### Commestibilità

#### **VELENOSO, TALORA MORTALE!**

I sintomi compaiono da trenta minuti a tre ore dopo l'ingestione. I principi tossici di questo fungo colpiscono prevalentemente il sistema nervoso centrale.

### Osservazioni

Numerosi sono stati i casi di intossicazione su tutto il territorio italiano. Provoca avvelenamenti assai gravi ed in assenza di un adeguato soccorso non si possono escludere conseguenze anche drammatiche.

### Ecologia

Fungo simbiote.