

Lepista nuda



(Bull.: Fr.) C.ke - "Agarico violetto" o "Violone"

Cappello: tra 6 e 15 cm. di diametro, da lilla a violetto, talora con sfumature ocracee verso il centro

Lamelle: concolori al cappello, poi sfumate di rosa

Gambo: concolore al cappello, robusto, cilindrico, con base cotonoso-feltrata

Carne: più chiara, non bianca, comunque bordata di viola

Odore: tipico ed aromatico. L'intero corpo fruttifero appare di colore violetto-bluastrò

Principalmente confondibile con

* "Lepista glaucocana", di colore molto più chiaro, grigio-lillacino. Per il resto identica. Innocua.

* "Lepista sordida", più piccola ed esile. Innocua.

* Taluni cortinari di colore simile, come il "Cortinarius varicolor", generalmente innocui, che tuttavia, all'attento osservatore, mostrano residui di velo più o meno evidenti (cortina) e lamelle ocracee.

Dove si trova

Specie autunnale, raramente presente anche in primavera, comune, soprattutto sotto le conifere, dove cresce formando spesso grandi cerchi.

Commestibilità

In genere è considerato un buon commestibile, ma taluni non lo gradiscono per l'odore troppo accentuato.

Osservazioni

Specie monocromatica. Tra i funghi che le possono assomigliare non risultano esservi specie pericolose.

Ecologia

Fungo saprofita.